

## Impfkalender für Jugendliche und Erwachsene (modifiziert nach STIKO, Juli 2006\*)

Impfstoff/Antigenkombination	Alter in vollendeten Jahren: 9-17	ab 18 Jahren	ab 60 Jahren
<b>Diphtherie und Tetanus (Td)</b> Ab einem Alter von 5 bis 6 Jahren wird zur Auffrischimpfung ein Impfstoff mit reduziertem Diphtherietoxoid-Gehalt (d) verwendet.	Auffrischimpfung: Diese sollte möglichst nicht früher als 5 Jahre nach der vorhergehenden letzten Dosis erfolgen	Auffrischimpfung: Diese sollte möglichst nicht früher als 5 Jahre nach der vorhergehenden letzten Dosis erfolgen (alle 10 Jahre)	
<b>Pertussis (aP)**</b>	Auffrischimpfung: Diese sollte möglichst nicht früher als 5 Jahre nach der vorhergehenden letzten Dosis erfolgen	Bei Indikation entsprechend STIKO: z. B. enger Kontakt zu Neugeborenen	
<b>IPV (inaktivierte Poliomyelitis-Vakzine zur Injektion)</b>	Auffrischimpfung: Diese sollte möglichst nicht früher als 5 Jahre nach der vorhergehenden letzten Dosis erfolgen	Auffrischimpfung bei Reisen in Polio-Risikogebiete (alle 10 Jahre)	
<b>Hepatitis B (HB)</b>	Grundimmunisierung aller noch nicht geimpften Jugendlichen und Komplettierung begonnener Grundimmunisierung	– Reisende in Endemiegebiete – berufliche Indikation – medizinische Indikation	
<b>Masern, Mumps, Röteln (MMR)</b>	Bei fehlender Immunisierung zwei MMR-Impfungen im Abstand von mind. 4 Wochen bzw. Nachholen der zweiten MMR-Impfung	Bei fehlender Immunisierung eine MMR-Impfung, bei Frauen Röteln- Titerkontrolle 6–8 Wochen nach der Impfung	
<b>Varizellen</b>	Ungeimpfte Jugendliche mit leerer Varizellenanamnese	z. B. seronegative Frauen	
<b>Influenza (Grippe)</b>			jährlich
<b>Pneumokokken</b>			Alle 6 Jahre

\* Mod. nach Epidemiologisches Bulletin 30/2006, Robert Koch-Institut (Auszug)

\*\* Monoimpfstoffe gegen Pertussis in Deutschland nicht mehr verfügbar, daher Kombinationsstoffe verwenden.